Mode d'emploi du Kit de Blanchiment des dents Whitelight

-Version Française *améliorée grâce à l'expérience de nos utilisateurs*-

© www.foire-discount.com

Le blanchiment est à faire deux fois par semaines, il est préférable de l'effectuer sur des dents préalablement légèrement brossées (les gencives ne doivent pas être micro-coupées et la double gouttière doit être sèche).

La lampe accélératrice et le gel de blanchiment (incolore)

- Ouvrir le cache-piles en le tournant vers la gauche.
- Retirez la pastille éventuellement placée sous les piles (les 2 piles doivent être l'une sur l'autre) et refermer.
- Placer la double gouttière induite de gel de blanchiment dans la bouche.
- Mettre la lampe entre la double gouttière et vos lèvres et appuyez sur le bouton blanc pour allumer.
- Laissez agir 10 minutes.

Mode d'emploi du gel reminéralisant (vert)

Le gel reminéralisant permet de restructurer l'émail de vos dents après le traitement et réduit les effets indésirables de micro-brulures. Il est à utiliser après votre traitement de blanchiment.

- Etalez le gel à l'intérieur de la double gouttière préalablement nettoyée et séchée.
- Placez-la dans votre bouche durant 5 minutes.
- Enlevez-la, brossez et rincez vos dents.

Quelques astuces :

Pour suivre l'évolution du traitement, vous pouvez utiliser le nuancier de couleur que nous mettons à votre disposition (l'objectif n'est pas d'arriver jusqu'à la teinte N1 !).
Les meilleurs résultats s'obtiennent après 12 à 24 sessions.
Le blanchiment s'effectue uniquement sur le devant des dents.
Lorsqu'il y a du gel sur vos gencives vous pouvez le retirer avec un coton tige.
Si vous avez mis trop de gel, vous allez peut-être ressentir des picotements sur vos gencives, il faut donc arrêter le traitement pour cette fois-ci, à moins que le nettoyage au coton tige fasse disparaitre ces picotements.
Pendant la période de traitement vous pouvez éprouver des sensations de chaud ou froid sur vos dents, c'est normal.

NUANCIER DE COULEUR

Mise en garde :

Le gel ne blanchit que les vraies dents, incompatible donc avec les dents artificielles, couronnes, plombages, bridges, et collages.
Lors de l'utilisation de produit à base de peroxyde de carbamide, la sensibilité des dents et gencives s'accentuent.

Contre indication :

Tenir le gel de blanchiment hors de portée des enfants et à l'abri de la chaleur.
Ne pas utiliser si vous êtes enceinte
Ne pas avaler.
Eviter le café/tabac/soda dans les heures qui précèdent le blanchiment.
Si vous suivez un traitement au niveau dentaire/buccal ou que vous avez subit récemment une intervention, parlez en avant tout à votre dentiste/médecin.